

107 年度急診醫學科專科醫師審試題申覆結果公告

題號	答案	題目	決議
15	A	<p>關於小兒外傷，下列敘述何者較不適當？</p> <p>(A) 小兒胸部創傷，肋骨骨折較肺挫傷常見。</p> <p>(B) 小兒腹部鈍傷最常見為脾臟裂傷，大多數不需要血管栓塞或手術治療。</p> <p>(C) 環甲膜切開術可在 12 歲以上之兒童執行。</p> <p>(D) 若需要輸血，每公斤需 20mL 的 pRBC。</p> <p>(E) 緊急處置時若打不上靜脈針，可考慮骨針。</p>	(A)、(D)皆可
28	B	<p>關於橫紋肌溶解症 (rhabdomyolysis) 的敘述，下列何者較不適當？</p> <p>(A) 診斷標準為血漿中 creatine kinase (CK) 值大於正常值上限的 5 倍以上，但須先排除心臟及腦部疾病。</p> <p>(B) 血液 CK 值能有效預測急性腎臟損傷的風險。</p> <p>(C) 可合併高血鉀，高血磷及低血鈣等電解質異常。</p> <p>(D) 治療需給予大量輸液及鹼化尿液，最好可維持尿量大於 300 mL/hr。</p> <p>(E) 血液 myoglobin 半衰期較 CK 短，24 小時後不建議拿來診斷橫紋肌溶解症。</p>	(B)、(D)皆可

註：僅公告答案異動之結果