

臺北榮民總醫院 函

地址：112201 臺北市北投區石牌路二段
201號

聯絡人：傅筱淳

聯絡電話：2871-2121#85517

電子信箱：hcfu@vghtpe.gov.tw

受文者：社團法人台灣急診醫學會

發文日期：中華民國114年9月15日

發文字號：北總職醫字第1145100493號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關衛生福利部全國解毒劑儲備網之毛地黃解毒劑

(Digoxin immune Fab, DigiFab®)使用條件說明，請查
照。

說明：

一、本院毒藥物防治諮詢中心負責緊急醫療特定解毒劑管控中心業務，建置全國解毒劑儲備網，落實特定解毒劑的採購、配置及管理，以提供中毒病患可及時得到解毒劑救治。

二、依據全國解毒劑儲備網公告規定，Digoxin immune Fab, DigiFab®之使用，須以「急性大量毛地黃中毒」為前提，並同時符合下列相關條件之一，始得使用：

(一)中毒後產生嚴重而可能致命(life-threatening)之毒性徵狀(心跳停止；心室性心律不整、逐漸惡化之心搏變緩或二至三度之房室傳導阻斷，合併生命徵象不穩定者如嚴重低血壓)，且使用傳統治療方式反應不佳。

(二)中毒患者存在明顯可能導致心跳停止之危險因子時

(digoxin藥品成人服食量大於10 mg；兒童服食量大於4 mg；血中digoxin濃度在服用後約6-8小時之濃度大於10 ng/ml)。

(三)血鉀濃度大於 5.5 mmol/L且併有心電圖變化；或逐漸嚴重之高血鉀症，且對於傳統治療方式如葡萄糖加胰島素，碳酸氫鈉或鉀離子結合樹脂無明顯立即反應之高血鉀症。

三、近期發現部分醫院於非屬「急性大量中毒」情形下使用旨揭解毒劑，恐致有限之藥品資源遭不當耗用，影響實際急重症病患DigiFab®解毒劑之調度與臨床使用。


四、為確保 (Digoxin immune Fab, DigiFab®) 解毒劑使用符合規定，請各醫院醫療團隊於臨床評估可能須使用 DigiFab®的中毒病人時，務必遵循「急性大量中毒」之先決條件，並依全國解毒劑儲備網使用規定執行。

五、相關使用規範可逕至全國解毒劑儲備網<https://www.pcc-vghtpe.tw/antidote/> 參閱；若有疑問，請洽解毒劑管控負責人：傅筱淳藥師，電話：02-28757525轉85517。

正本：中國醫藥大學附設醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、花蓮慈濟醫院、基隆長庚紀念醫院、衛生福利部基隆醫院、國立臺灣大學醫學院附設醫院、國防醫學大學三軍總醫院、國泰綜合醫院、馬偕紀念醫院、臺北市立聯合醫院、新光吳火獅紀念醫院、台北長庚紀念醫院、臺北醫學大學附設醫院、亞東紀念醫院、耕莘醫院、衛生福利部臺北醫院、恩主公醫院、淡水馬偕紀念醫院、國立臺灣大學醫學院附設醫院金山分院、衛生福利部桃園醫院、國軍桃園總醫院、敏盛綜合醫院、林口長庚紀念醫院、大園敏盛醫院、怡仁綜合醫院、臺北榮民總醫院桃園分院、聯新國際醫院、羅東博愛醫院、國立陽明交通大學附設醫院、臺北榮民總醫院蘇澳分院、羅東聖母醫院、國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院、東元綜合醫院、新竹馬偕紀念醫院、仁慈醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院、衛生福利部苗栗醫院、臺中榮民總醫院、衛生福利部臺中醫院、中山醫學大學附設醫院、澄清綜合醫院中港分院、童綜合醫院、衛生福利部豐原醫院、光田綜合醫院、衛生福利部南投醫院、衛生福利部草屯療養院、彰化基督教醫院暨中華路分院、秀傳紀念醫院、二林基督教醫院、衛生福利部彰化醫院、中國醫藥大學北港附設醫院、國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院、嘉義基督教醫院、大林慈濟

醫院、嘉義長庚紀念醫院、柳營奇美醫院、奇美醫院、衛生福利部新營醫院、國立成功大學醫學院附設醫院、高雄長庚紀念醫院、高雄榮民總醫院、國軍高雄總醫院、高雄市立小港醫院、義大醫院、高雄市立大同醫院、屏東基督教醫院、安泰醫院、輔英科技大學附設醫院、馬偕紀念醫院台東分院、衛生福利部雙和醫院、衛生福利部醫事司、台灣急診醫學會、本院急診部、職業醫學及臨床毒物部

副本：



裝

訂

線