

全國口服抗病毒藥物合約機構之Paxlovid及Molnupiravir用藥比例分別為83%及17%。惟Paxlovid用藥比例低於50%之醫院有97家，診所與衛生所共33家。各縣市統計如附件，請貴局針對Paxlovid用藥比例低於50%之院所瞭解原因，評估是否為長照機構或血液透析主責醫院等因素，並可視需要聘請專家輔導訪視。倘經輔導仍未改善者，得視情節解除合約。各縣市Paxlovid用藥比例低於50%之合約機構清冊將由轄屬衛生福利部疾病管制署各區管制中心另行提供貴局。

四、COVID-19口服抗病毒藥物為珍貴之公衛用藥，為提供臨床醫師開立藥物之用藥評估參考，本中心辦理COVID-19口服抗病毒藥物治療相關研討會，課程影音內容及簡報可至衛生福利部疾病管制署全球資訊網首頁>COVID-19防疫專區及最新資訊>數位學習課程項下瀏覽參考。

(一)新光吳火獅紀念醫院感染科黃建賢主任：COVID-19藥物治療之流程及口服藥物選擇。

(二)國立臺灣大學醫學院附設醫院教學部盛望徽主任：高風險病人COVID-19口服抗病毒藥物治療與處置Paxlovid藥物交互作用與處置。


(三)國立臺灣大學醫學院附設醫院感染科陳抱宇醫師：  
COVID-19 Antiviral treatment update。

(四)新光吳火獅紀念醫院感染科黃建賢主任：Molnupiravir for treatment of COVID-19。

(五)國立臺灣大學醫學院附設醫院盛望徽主任：Paxlovid for treatment of COVID-19。

正本：地方政府衛生局

副本：教育部、國防部、國軍退除役官兵輔導委員會、中華民國醫師公會全國聯合會、台灣感染症醫學會、社團法人台灣感染管制學會、社團法人台灣兒童感染症醫學會、社團法人台灣急診醫學會、台灣內科醫學會、台灣醫院協會、台灣醫學中心協會、中華民國區域醫院協會、台灣社區醫院協會



裝

訂

線

